

健康サポート

【問合せ先】各記事の問合せ先にお問い合わせください

■予防接種忘れていませんか？

接種期間が終了間近となっている予防接種や、接種間隔が離れているため忘れてしまいがちな予防接種についてお知らせします。定期予防接種は、接種期間を過ぎてしまうと全額自費での接種となりますので、ご注意ください。予防接種は感染を防ぐための有効手段です。予防接種で免疫をつけ、病気を予防しましょう。

<小児>

【麻しん風しん混合ワクチン】

対象者／令和3年度年長児 接種期間／令和4年3月31日まで



麻しんとは

発熱・咳・鼻水・目ヤニ・発疹等が主な症状で肺炎・中耳炎・脳炎などの合併症が起こることもあります。感染力が高く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%症状が発生します。

風しんとは

発疹・発熱・首の周りや耳の後ろのリンパ節の腫れ等が主な症状です。合併症として血小板減少性紫斑・脳炎等の合併症が起こることもあります。

【二種混合（ジフテリア・破傷風）ワクチン】

対象者／11歳以上13歳未満

接種期間／13歳の誕生日の前日まで



ジフテリアとは

発熱、のどの痛みなどで始まり、のどに白い膜が出来たり、首のリンパ節が腫れたりします。菌が出す毒素が心筋炎や神経麻痺を起こし重症化することもある病気です。

破傷風とは

傷口等から菌が身体に入り込むことにより感染します。口が開きづらい、顎が固くなる等の症状から始まり、歩きづらい、排尿・排便障害等を経て最後には全身の筋肉が固くなり、息ができず、死に至ることもある病気です。

<高齢者>

【肺炎球菌ワクチン】

対象者／



①過去に肺炎球菌の予防接種の接種歴のない方で、令和3年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人

②60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

接種期間／令和4年3月31日まで

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌によって引き起こされる感染症（肺炎、化膿性髄膜炎、敗血症等）です。日常的に生じる成人の肺炎の25～40%は肺炎球菌が原因と考えられています。

ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

●予防接種に関する問い合わせ先／健康福祉課 健康推進係 65-0001