

毎日の感染予防が大事です !!

子どもの「三大夏かぜ」に注意 !!

夏かぜとは？

夏に子どもを中心に患者数が増える感染症の総称で、以下に示す感染症が主なものです。

例年、5～6月に流行が始まり、7～8月にピークを迎えます。



	咽頭結膜熱 (プール熱)	手足口病	ヘルパンギーナ
主な症状	高熱 (38～39℃)、咽頭炎、結膜炎	口の中、手のひら、足の裏などの水疱発疹、発熱、大人が感染した場合には痛みが強く出ることが多い。	急な発熱 (高熱)、口の中 (奥) にできる水疱 (痛みで食欲不振になることあり)
原因ウイルス	アデノウイルス	コクサッキーウイルス、エンテロウイルス	コクサッキーウイルス、エコーウイルス
感染経路	●飛沫感染 患者のくしゃみや咳に含まれるウイルスを吸い込むことによっておこる。 ●経口感染・接触感染 水疱の内容物や便に排出されたウイルスが手指やタオル等を介して、口や目に入ることによっておこる。		
潜伏期間	5～6日	3～6日	2～4日

感染を予防するためには・・・

● 手指は石けんと流水でよく洗う。

これらのウイルスはアルコール消毒が効きにくいため、石けんと流水で手を洗いましょう。

症状がおさまった後も2～4週間程度は、便などにウイルスが排出されています。普段からトイレの後、おむつ交換の後にはしっかりと手洗いをするのが大切です。


● タオルの共用はしない。

タオル等からの接触感染によりひろがります。

症状がある場合には、自宅でもタオルなどを共用しないよう注意しましょう。

● 咳エチケットに努める。

症状がある場合はマスクを着用するなど咳エチケットに努めましょう。



福岡県 感染症 発生動向



福岡県保健環境
研究所 HP

